

Reflexions Sur L'amputation Des membres =

Par M. Trucq, gagnant maîtrise à l'hôpital

St. andré de Bordeaux.

L'amputation Des membres est l'extreme De La chirurgie.
Les Bons praticiens connoissent de cette verité, et plusieurs
D'entr'eux disent qu'il ne faut presque Jamais y avoir recours,
ils se sont occupés Des moyens De rendre cette operation inutile,
En joignant les secours De Leur art; aux secours de La
nature. il n'en est pas De même D'une quantité D'autres
Chirurgiens, qui trouvent trop souvent La nécessité D'amputer
assujettis à une ancienne habitude; ils suivent aveuglément Les
Regles et préceptes Ecrits par nos anciens maîtres, comme eux
ils n'ont pas la assés de confiance à cette même nature, qui
a Des ressources que nous ne connoissons pas: et souvent Lors que
nous La croyons la déffiant ce n'est que notre impuissance qui
Condanne, et nos procédés qui L'empêchent D'agir. Combien de
fois ne s'aton pas vûe victorieuse Dans des cas Les plus graves, et
Combien de membres n'aton pas amputés, qu'elle seule aurait
Conservé.

Dans les gangrènes, Dans des playes D'armes à feu, et Dans
Les fractures compliquées, il est plus facile au plus grand nombre
Des chirurgiens, De condamner un membre à L'amputation que
De traiter La maladie qui L'affecte. Ce n'est pas en amputant
un Bras, une jambe, que Le chirurgien fait paraître sa
Dextérité et son savoir; Les operations sont trop mécaniques pour
Répandre un grand mérite Sur celui qui Les fait: nous serions
Donc toujours Exposés à voir Les chirurgiens ordinaires, Bornés par
Ces autorités suivre aveuglément cette Routine, en une académie



ARC 58 n° 27

L'homme s'avant n'était continuellement occupé, à perfectionner
Le plus utile de tous les arts.

Nous espérons voir sortir de son sein un corps de doctrine qui
Acquiesce aux cas qui nécessitent l'amputation, à un bien petit nombre.
Cette réforme si nécessaire et si utile à l'humanité sera à la
Chirurgie, ce reste de Crusac et mettra les critiques de cette
Science en défaut. on verra que le But du véritable chirurgien,
est de conserver et non pas de détruire, et si quelque fois il est
obligé de priver son semblable de quelqu'un de ses membres, ce
n'est qu'après avoir employé inutilement tous les autres secours,
qu'il est ~~forcé~~ forcé d'en venir à ce moyen extrême pour lui
Conserver la vie.

Une telle réforme faite par l'Académie de chirurgie, sera
une loi, un code en chirurgie; qui se répandra dans toutes les
parties du monde ou des ouvrages de cette illustre compagnie,
ont coutume de vivifier l'art de guérir en l'éclairant des hommes qui
s'y distinguent. des observations des praticiens, jetteront un grand jour
Sur la matière qui nous occupe, les observations n'étant que des
faits qui se passent sous les yeux de l'observateur; doivent être
Des Règles invariables pour la pratique. Je suppose des observations
Bien faites, et par des hommes veridiques et incapables d'en
supposer; c'est sans ces vices que je L'homme de présenter
à l'Académie, quelques faits, que j'ai eu l'occasion d'observer.

L'amputation d'un membre affecté de gangrene, paraît
inutile pour la cure de cette maladie; puis qu'il faut toujours
attendre que la nature ait borné ses progrès, or puis que l'amputa-
tion ne peut pas arrêter les progrès de cette maladie, elle est non

Seulement inutile, mais même préjudiciable. elle exposeait les malades, à tous les accidents et dangers qui accompagnent cette opération. La nature qui a fait tout des fruits pour arrêter cette cruelle maladie; se trouve épuisée et hors d'état de résister à une amputation: D'ailleurs qu'els avantages retirerait-on de cette opération sans ce cas cy, si l'ischémie s'est entièrement emparée d'un membre et que la nature ait eu la force de surmonter cette maladie, elle aura celle de séparer le mort d'avec le vif, et elle l'aura simplifié de chose à faire au praticien. Ce qui au contraire il y a encore un reste de circulation, ne peut on pas espérer de conserver le membre; le traitement de ces maladies devrait seul occuper les chirurgiens, et la pratique qu'on s'est donnée mérite une réforme.

Depuis quatre ans que je sers l'hôpital, la quantité de chirurgiens gagnant-maitre, se la occasion d'observer tout ce que dans le traitement des gangrenes, l'usage des rimides spiritueux, toniques, anty-septiques &c. étoit plus préjudiciable qu'avantageux. Ces rimides agissent comme tout le monde sait, en irritant, en crispant, et en augmentant l'écoulement de la partie: De là il s'en suit que le diamètre des vaisseaux est diminué, que la circulation est plus gênée, et que l'engorgement est plus considérable: Donc les rimides dont nous parlons loin d'arrêter les progrès de la gangrene, ne font que la propager en augmentant l'écoulement, l'engorgement, l'inflammation, et en entraînant un reste de circulation qui se faisait dans des vaisseaux qui avoient échappé à la contagion de la maladie; mais qui ne peuvent l'échapper à l'action de ces rimides. Et cet état de force de ces vaisseaux ne répond plus



à l'action stimulante de ces rimides, & de une tension inégale, et une
Dégradation dans les oscillations des vaisseaux produite par un
Défaut de compensation; Des vibrations différemment modifiées sur
les uns et sur les autres vaisseaux. —

Les Rimides molliant et les Résolutif, semblent ouvrir la
préférence dans cette circonstance, ils agissent bien différemment des
précédents; au lieu de porter l'inflammation dans une partie affligée, —
ils y portent le calme et la tranquillité, leurs molécules pénètrent
les fibres des vaisseaux sans les irriter, les humectent et leur rendent
leur élasticité naturelle. L'écoulement et l'étranglement des vaisseaux
sont détruits, la chaleur naturelle y est rétablie, la circulation
dans les vaisseaux capillaires est plus aisée et par elle la vie est
conservée dans la partie menacée de pourriture. Les incisions
qu'on fait ordinairement sur les membres gangrénés, sont encore
plus nuisibles que l'application des anti-septiques; Le but du
 praticien, lui le faisant est de mettre les rimides à même d'opérer
avec plus d'énergie: cette théorie porte à faux. Si les incisions
dont il s'agit ne s'étendent que sur la partie morte; elles sont
Inutiles, si elles pénètrent au-delà, elles sont nuisibles. 1^o parce
qu'il arrive qu'on peut couper quelque partie saine, qui auroit
été d'un grand secours pour conserver la vie au membre. —

2^o La douleur qu'on fait éprouver au malade, produit une irritation
qui augmente l'engorgement de cette partie; lui déterminant une
plus grande quantité de sang, et d'autres humeurs à se porter vers
la partie irritée. Ce n'est qu'en bornant les incisions, les anti-septi-
ques, les toniques, &c. que je vu la nature se de barrer nombre
de fois, d'un membre entier et dans des cas même désespérés, terminer.

Les gangrènes beaucoup plus heureusement qu'on n'osait l'espérer. . .

I. observ.

Un homme âgé de quarante-cinq ans, fut porté à l'hôpital ayant toute une extrémité inférieure, dans un état de tuméfaction et de Stupor. Des gâles complètes, sans chaleur et sans aucune sensibilité. Cette maladie étoit le résultat d'un leucor de huit jours, que ce misérable à voit fait dans un endroit marécageux; en travaillant à faire des fossés. au premier coup d'oeil le malade parut sans ressource, je fis couvrir la cuisse, la jambe, et le pied; d'un cataplasme mouillant et résolutif. arrosé plusieurs fois dans le jour avec une Decoction de même nature, le malade fut mis à l'usage du Kina trois fois par jour; Ces moyens furent continués pendant quelque temps, mais le cinquième jour la gangrène se borna vers la partie supérieure de la jambe, le L'ambreau ou L'ambreau s'en beaucoup plus long. Sur la partie postérieure que sur l'antérieure. . .

La Supuration s'établit et la séparation du vif avec la mort se fit en peu de temps sans hémorragie, de façon que le dixième jour; il ne nous resta à faire qu'à séier le tibia et le péroné, qui étoient tout de charnis: et qui auraient prolongé la cure de la maladie. Le L'ambreau qui étoit vers la partie postérieure de la jambe fut conservé, et nous servit beaucoup pour la cicatrisation de la plaie en nous fournissant une portion de peau; qui abrégée la cure. . .

II. observat.

Le nommé mars naigre de quinié, âgé de vingt ans vint à l'hôpital à près avoir été trois jours étendu et Caché dans un fossé plein d'eau, et les jambes enfoncées dans l'argille jusqu'aux genoux. Les deux jambes étoient affectées de gangrène sèche, j'employai les mêmes remèdes pour celui-ci que pour le malade précédent; et j'en obtins les mêmes avantages. Le huitième jour la gangrène fut bornée à la partie moyenne de la jambe droite, la Supuration commença



à l'établir et les parties molles furent entièrement Cernées le quatorzième,
Si existait qu'elques tendons qui tenaient encore. La jambe gauche
ne fut pas si mal traitée, La gangrene n'affecta que des tendons orbitaux
et La peau qui couvre le métatars; Les tendons du muscle latéral
commun furent détruits, La Suppuration étoit bien établie Les parties
étoient dans le meilleur état possible: et promettoient une guérison prompte;
quand le misérable qui avait résolu de se venger d'un mauvais
traitement que son maître lui avait fait, et ne pouvant le faire sans
le détruire lui-même, se fit porter du lieu de vin et d'ivresse, il fut
saisi de mouvement convulsif et d'une espèce de tétanos qui le fit
périr dans dix heures de temps, il étoit au vingt six de la maladie.

III. observations.

Une petite fille âgée de treize ans, se fractura la cuisse vers
La partie supérieure du fémur, Les parents de cet enfant invoquè-
rent chercher Le Bourreau pour réduire La fracture. Le dernier
(que je cite avec horreur) à son ordinaire ne connaît point La
fracture, mais il dit qu'il y avait un nerf foulé: En conséquence
il fiota toute La partie de glace, et appliqua sur la partie
supérieure de la cuisse un bandage roulé si serré, qu'il fit
tomber le pied, La jambe, et La cuisse en gangrene; le bandage
resta quatre jours sans que les cris de la malade, pussent déterminer
C'est ignorant à le La chose:

Je fus appelé le douzième jour pour voir la malade, Je
trouvai cette petite infortunée dans un état affreux, Le pied et La
jambe commençait à se désarticuler, Les muscles de La jambe
tomboient par lambeaux; La Suppuration étoit affreuse La gangrene
étoit bornée aux parties supérieures de la cuisse. Le traitement de cette
maladie fut des plus simples, La mère de cet enfant avait des parties
sphacelées avec une décoction de différentes plantes, qu'un charrier des

Les voisins lui avait luigné; et dont il se servait lui même pour
Laver les pieds de ses freres lors qu'ils étoit malades. Cette decoction
pouvait être emolliente, dissolutive, Sétative. &c. Je ne change rien
au traitement qu'on lui faisait, je recommande seulement de la
panser trois fois par jour; et de couvrir les parties gangrenées avec des
Compresses trempées dans la même decoction. pour tout Régime je
fis donner un peu de nourriture à cet enfant, et plusieurs cuillerées
de vin sans la journée.

Je suivis exactement cette maladie, et je vis tomber l'empoussure
Et en différents temps; les muscles, et les tendons; les ligaments des
articulations étoit des parties qui résistoient. Les plus à la pourriture. La
jambe et le pied furent des premiers à se désarticuler, en suite
La jambe avec la cuisse, en fin; le trente-neuf de la maladie,
La portion du fémur qui étoit au dessous de la fracture tomba, avec
quelques portions d'apophyse qui l'asujettissoient aux parties saines.
Nous le moignon se trouva surmonté d'une portion de fémur d'un tiers de
son périoste, je suis cette portion qui avait deux pouces de longueur, tout
près du grand trochanter; le moignon de l'os ~~de l'os~~ détrempa bien et
La cicatrice se forma assez facilement. il faut observer que pendant le
traitement il n'y eut point d'hémorragie, et que la maladie, malgré la
grande Suppuration couvra assez d'embouppement, pour nous rassurer
sur son état. Je ne sais si elle devoit l'attribuer à la nourriture grossière
qu'elle prenoient, (car elle étoient adu parais très pauvres) ou au peu de
Remèdes dont elle étoit usage.

IV. observat.

Une fille âgée de quinze ans, vint à l'hôpital avec un ulcère
qui occupoit toute la partie antérieure de la jambe; Depuis la
tubérosité du tibia jusqu'à la partie inférieure de l'est, La surface
de l'ulcère étoit recouverte d'une ^{gangreneuse} brèche avec carie au tibia, le pied étoit



Ingorgé. Dematur, avec une supuration putride de la plus mauvaise nature.
Une Consultation des gens de l'art Décida L'amputation indispensable,
La malade; si opposa fortement, Des ce moment nous la crûmes sans-
ressources et victime de son antipathie. Je la fis panser avec une
Décoction Titative Deux fois par jour, on lui Donnoit également
Deux fois par jour; Deux verres D'apocrene febrifuge. Le sixième

à dans le troisième jour je trouvais les Bords de l'ulcère un peu Douloureux et Rouges, -
- timent Des - La Suppuration avait changé de nature: nous continuâmes les mêmes -
- plâtres D'armes - après on les dans Hemides. La Suppuration s'établit Bien L'escarre gangréneuse s' -
- usage D'un - Détacha, et Laisse Deux poudres et D'un D'tibia Demi Dans toute
- les incisions - Soit pour sizer la Circonférence, les parties se Détachent Le pied se Dégorga par la
- que la partie - grande Suppuration; L'exfoliation de cette portion de tibia se fit,
- soit pour - elle fut Remplacée par une matière Concrète et inorganique. La
- faciliter - malade Sortit Bien guérie au bout de cinq mois, non pas avec
- l'extraction - une jolie jambe; mais avec Deux poudres Remplis des fonctions. et
- Des corps - Dans les plaies D'armes-afes qui intéressent la Extrémité, L'ampu-
- étrangers - tion est un Moyen Bien Incertain pour conserver la vie au
- soit enfin - sujet; La nature a des Ressources infinies pour conserver la partie -
- pour faire - malade, ou pour s'en Débarrasser si elle lui Devient nuisible. Elle
- ces lésions - agit avec prudence, et Lorsqu'on ne la trouble pas Dans son ouvrage,
- me des - elle Remporte Des victoires qui Surprennent L'observateur. -
- Solides.

Ces incisions malgré L'autorité Des illustres chirurgiens, qui les ont
pratiquées ne doivent pas être admises généralement; pour nous Justifier
en vers ces Savants praticiens, on nous permettra De parler De l'usage
De L'observation. nous avons la occasion De voir souvent que ces incisions
avait Des suites fâcheuses, elles ne Remédient point à l'étranglement
parce qu'on ignore qu'elle soit la partie qui se forme; par consé-
- quent elles sont faites sans ordre, et sans préceptes: et souvent sur
Des parties étrangères aux accidents et qui sont d'une sensibilité

et d'une irritabilité sans égale. on coupe imperfectement une
aponévrose, une membrane, un muscle, cette section imparfaite
produit véritablement une irritation continue; or toute partie irritée
s'en gorge et s'en flame, donc; les incisions au lieu de faire cesser les
accidents ci-dessus ne font que les augmenter, d'ailleurs nous paroissons donc
plus préjudiciables qu'avantageux. Outre cela les incisions sont autant
de nouvelles playes qu'on fait au malade, et qui troublent la nature qui
est simple et uniforme dans sa marche, les ~~petits~~ accidents qui
accompagnent les playes d'armes à feu; ne viennent ordinairement qu'à
la suppuration, et la suppuration n'est certainement pas
l'ouvrage de l'art.

Lorsque les oscillations des vaisseaux ne peuvent pas dissiper l'engor-
gement, les parties seules et que quelque corps étranger a été introduit dans
la partie pour qu'on n'a pas disé pour les extraire; la nature s'en
de s'arrêter en formant différents abcès, qui indiquent au praticien
l'endroit qu'elle a choisi pour l'être inciser. on se peut alors assurer de
mettre pas induit la honte.

I. Observation. Un jeune prêtre irlandais, étant alla chasser tomba alla partie
moyenne de la cuisse un coup de fusil chargé de plomb, le malade
fut porté à l'hôpital le lendemain de l'accident. il avait plusieurs
petites playes avec un engorgement, et une tension de toute la
partie; on fit plusieurs incisions pour débiter et pour extraire les corps
étrangers, qui étoient du plomb, de la poudre, et quelque portion de
vêtements. Le malade fut saigné copieusement, les boissons délayantes,
les lavements et autres secours furent mis en usage; malgré tous ces
soins les accidents augmentèrent considérablement, les lèvres des nouvelles
playes qu'on avoit fait; s'enorgèrent beaucoup plus que les autres
parties. les muscles sortoit à travers, il n'y eut point de suppuration. La



fièvre augmenta, les Délirs les convulsions survinrent le malade —
mourut le six de l'accident. nous aurions plusieurs observations de même
genre à rapporter, mais en fait sont trop communs. —

II. observat. un gentil homme reçut un coup de fusil chargé de mitraille, à la
partie moyenne de la jambe; les os furent brisés et une partie
de la charge resta dans la jambe, la première consultation
decida l'amputation du membre. mais le malade, si refusa: alors
on attendit tout de la nature, la partie fut mise en situation, on ôta
les esquilles d'os et les autres corps étrangers qui pouvait être extrait
facilement; et sans faire aucune incision. le malade fut saigné
plusieurs fois, des Docteurs d'opérateurs, des lavements furent mis en usage,
on pansa le malade, avec une Décoction Émolliente et Résolutive. —
La fièvre, le délir, les mouvements convulsifs survinrent, et ne
cédèrent qu'à une abondante suppuration qui fut établie le huitième
jour. il se forma les plusieurs endroits des abcès qui furent
ouverts dans leur temps, par de petites incisions; la Suppuration
fut très longue elle facilita l'extraction des corps étrangers qui avoient
resté dans la partie et quelques esquilles d'os; qui sortirent avec.
Le malade fut guéri, au bout de quatre mois; ayant la jambe
plus courte que l'autre de deux pouces. —

III observat. La nommée Marie got, âgée de cinquante deux ans reçut
au bras un coup de fusil à bout touchant; chargé de plomb: La
malade fut portée à l'hôpital le lendemain. Je trouvai l'entrée
du coup à la partie moyenne du bras sans interne, et la sortie
à la partie opposée; le coup fut porté obliquement de l'os du haut,
et de dedans en dehors, toute l'explosion du coup se fit dans
l'intérieur du bras. —

L'humeur fut mise en pièces, avec des Ecato qui s'étendoient —

jusqu'au col de l'écor; Les parties molles furent dilacées, l'artère
Brachiale fut interrompue sans qu'il y eût hémorragie, toute cette extrémité
extrême jusqu'à l'épaule: étoit dans une stupeur des plus grandes, sans
chaleur et sans sentiment. —

La partie fut couverte de fomentations émollientes. & résolutive,
Les saignées et les Boissons délayantes furent mises en usage; malgré
cela les accidents augmentèrent, la fièvre, le Délire, les convulsions.
La maladie resta dans l'ist état jusqu'au huitième jour qu'une
Suppuration sanguinolente; commença à dégorger les parties. La
gangrène se forma vers la partie moyenne du muscle Deltogène,
je coupai le bras à l'endroit de la plaie; et sus le mort pour
me débarrasser dans les panséments de cette extrémité pourrie; et
nous laissons à la nature le soin de s'élever le mort par le vit. —

La Suppuration fut très Bien établie le douzième, Les accidents
Les plus graves disparurent; Les bruits tombèrent et pour lors il
y eut deux L'ambres séparés l'un de l'autre, par un état d'humidité
qui couvrait tout le corps de l'os; et qui se terminoit vers le col de
l'écor. la tête de l'humérus ne fut point atteinte, la portion d'os qui
séparoit les deux l'ambres n'étoit qu'aux parties molles; La Suppura-
tion se détacha & j'en fis l'extraction le trente deuxième jour, la
malade sortit bien guérie cinquante jours après l'accident. —

IX observati. un matelot âgé de vingt ans, Dans un combat naval eut le bras
fracturé par une grosse Balle; Le coup porta vers la partie moyenne
du bras sans faire plaie aux parties molles. De ce moment toute cette
extrémité fut dans une stupeur une attention des plus grandes, Le chirurgien
du navire; crut qu'il n'avoit qu'une fracture à soigner: Inconsciemment
après l'avoir réduite, il appliqua sur la partie un Bandage roulé
plus ou moins serré. il saigna le malade deux fois, et il arrivoit —



L'appareil plusieurs fois du jour avec de l'essence.

On nous porta le malade à l'hôpital, le cinquième jour; avec le bandage que le chirurgien avait fait, et toute destruction gangreneuse jusqu'à l'épaule. Le malade avait de la fièvre, sans délire ni convulsions, il avait l'épaule, le col, et la poitrine extrêmement tuméfiés, on le saigna suivant les forces, on le mit à un régime convenable à son état. La partie fut couverte d'émollients et dissolvants, la gangrene se borna à la partie supérieure du bras antérieurement, et à l'épaule postérieurement. La suppuration étoit putride et sanguinolente, et de la plus mauvaise nature.

Le sixième jour les extrémités de l'humérus fracturées étoient fait pour traverser les chairs pourries, je finis de couper le bras à cet endroit. Je continuai à panser le moignon gangrené; avec un digestif animé. La suppuration s'établit bien; elle fut abondante et vigoureuse à l'épaule et des autres parties. Elle détacha les croûtes et le vingt-quatrième le moignon se trouva bien détaché, mais il avoit dans son centre une portion de l'humérus qui étoit dure, nous le tirâmes près des chairs vivantes.

La peau avoit été détruite postérieurement jusqu'à l'épaule, mais du côté interne de l'articulation du bras avec l'épaule, il y avoit un lambeau que nous considérons; ce lambeau abrégea singulièrement la cure. animée que le moignon se débarrassoit, la peau s'étendoit et diminuoit d'autant la plaie; il n'est donc pas indifférent dans les gangrènes, et dans les plaies d'armes à feu, d'emporter ou de conserver ce lambeau de peau: rien de ce qui a été détruit ne le régénère, (dit monsieur Louis). il faut donc, conserver ce qui existe. ce qu'il y a de bien certain que ces lambeaux qui sont importés par quelques praticiens, nous ont été d'un grand secours dans plusieurs cas; et la cure de l'amputation ci-dessus en fut terminée heureusement.

V. observat

Deux matelots d'une goëlette anglaise étant sur une même ligne de direction, l'un derrière l'autre, furent chacun la cuisse droite emportée par un boulet de canon de Doune, le premier blessé mourut sur le champ d'hémorragie faite de Sicours. Car le chirurgien anglais, s'étoit livré avant le combat: Sans doute pour s'en débarrasser toute l'honneur; et étoit hors l'état de secourir ces malheureux.

Le second blessé sauta de sang lui-même, lui servant très fort le moignon; avec un bout de corde, on lui voya chercher du secours.

(a) La goëlette étoit américaine elle se battit avec la frégate espagnole, sans mettre son pavillon au vent qu'après que le mal fut fait quelle se fit reconnaître

Sur la frégate La marquise de la Fayette, (a) Le premier chirurgien de la frégate qui ma communiqué cette observation; fit porter le blessé sur son bord, il fit la ligature de l'artère crurale tout près du ploy de la cuisse; et pansa le membre trouqué avec un digestif simple. il couvrit la partie d'une fomentation faite avec parties égales d'eau de sucre, et de vin; il saigna le malade autant de fois qu'il le crut nécessaire, il le mit à l'usage des boissons diluantes et d'un régime conforme à son état.

Après les premiers accidents, la suppuration s'établit bien, les escars tombèrent et l'aimant une portion de la fémur de son périoste, le chirurgien de Sicours prit des chairs vives. La cicatrisation étoit bien avancée lorsque la frégate fut à l'ancre dans un port d'Espagne; on l'on lava tous les blessés, le chirurgien regrettoit

Bien peu de ne pouvoir finir cette cure.

VI observat

Dans le même combat, un matelot fut blessé par une balle qui lui traversa la jambe dans sa partie inférieure; l'os du tibia se cassa, et les muscles flexeurs communs des os de la jambe et postérieurs. La plaie ne fut point diluée, on pansa le malade avec un digestif simple, la suppuration s'établit l'escar tomba et le blessé guérit.

VII observat

un canonier ayant tiré plusieurs coups de canon sans la réussite



tut l'imprudence de se mettre à cheval sur le canon, pour le charger
de nouveau; ayant mis la poudre dedans il doit même de le souffler,
Lors qu'il s'explorait. Le fouteur qu'il tenait dans la main, fut
arraché avec tant de violence que les trois Doigts de la main avec la
qu'elle il tenait; furent arrachés ausy: et le sujet aurait été emporté
avec, si un de ses camarades ne l'avoit attrapé par ses vêtements. ce
il y eut une delabrement considerable sur la partie latérale de l'avant-
bras jusqu'au coude, les os du carpe et metacarpe; étoient exposés
des teguments communs. Les tendons des muscles biceps, et flexisseurs
des Doigts; étoient déchirés: La commotion fut si grande que la
partie étoit sans sentiment, on employa des moyens indiqués au pareil
cas, comme saignées, frictions delayantes, Lavement topiques
Emolliants et même des purgatifs. malgré cela les accidens augme-
ntaient, la fièvre, le delirium des mouvements convulsifs, une suppu-
ration putride nous faisait craindre pour la vie du malade. Le
neufieme jour la fièvre diminua, de même que le delirium
La Suppuration fut plus abondante; mais elle n'étoit pas mûre, et
une consultation decida l'amputation du bras à la partie
supérieure; elle fut faite et le malade mourut le dixieme jour
de l'opération, dans le delirium et des convulsions.

VIII. Observet

Jean Quay matelot, fut blessé à l'épaule par une grosse
Balle carrée qui fractura qu'il a été de l'humérus, et l'omoplate.
Le chirurgien du navire, ôta des corps étrangers et pansa le malade
avec des résolutifs. il lut à combattre pendant des six premiers jours.
Les accidens les plus formidables, il employa des saignées, des boissons
et autres. La Suppuration s'établit et le blessé, parut mieux. et
on l'envoya à notre hôpital le dixieme jour de sa blessure,
je trouvais l'épaule et le col; dans un état de tumefaction et de
tension si grande, que le malade ne pouvait faire aucun

mouvement. La Suppuration étoit très abondante mais de la plus mauvaise nature, j'étois plusieurs portions d'ostéite de l'humérus, que de la côte de l'omoplate: un dépôt très considérable s'établit sur la partie latérale du col; au dessus de la clavicule et sur le rebord antérieur des muscles trapèze, je l'ouvris et y mis un coton lu de gisant par dessous la voûte, faite par la pousse acromion et l'extrémité humérale de la clavicule; pour la faire sortir par la plaie que la dalle avoit fait, à la partie postérieure et supérieure du bras. La Suppuration étoit très abondante, nous employons des injections d'eau de Barres, et le malade fut guéri vingt huit 1779. En voy de guérison.

Dans des fractures compliquées on proposoit souvent l'amputation comme l'unique moyen, de conserver la vie au malade: et souvent c'est elle qui la lui ôte. J'ai vu guérir sans amputation une qu'antité de malades, de fractures compliquées qui toutes étoient de nature (suivant les auteurs) à l'exiger.

1. observati. un matelot tomba au fond de cale, et se fractura la jambe un peu au dessus des malléoles: la fracture étoit compliquée d'hémorragie, et d'une plaie de trois pouces qui laissoit sortir l'extrémité inférieure du tibia d'un pouce et demi. Je réduisis la fracture sans débrider la plaie, je mis la partie en situation avec un bandage compressible; les saignées et les autres moyens ne furent point négligés.

La Suppuration commença à s'établir aux environs de la fracture, il se forma plusieurs abcès qui furent ouverts dans leur temps: le tibia fut de même de son périoste de deux pouces de long. le trente deux la partie étoit bien dégorgée, les



plaies d'éclat, il ne restait que cette portion de tibia qui nous —
embarrassait; nous priâmes le party de la scier et d'exporter toute la
portion saine, les extrémités du tibia se rapprochèrent par l'action
des muscles, et d'intervalles qu'elles devaient être remplis par du suc
qui sortoit de l'extrémité de l'os scier; qui en se congelant soude
les deux parties. On semble... des extrémités du péroné qui étoient
recouvertes des parties molles qui l'entouraient, se rapprochèrent l'une
sur l'autre: enfin le cal se forma; les plaies se consolidèrent
peu à peu et le malade fut guéri au bout de sept mois, ayant
la jambe plus courte que l'autre de deux pouces.

II observat.

Un sieur de Hong fut la jambe fracturée, par un pieu —
de bois qui lui tomba dessus, la fracture étoit oblique et alla
partie moyenne de la jambe. Elle étoit compliquée d'une plaie
de quatre pouces de long, les deux extrémités du tibia fracturées
avoient été enfoncées dans la terre; et une des extrémités
sortoit à travers la plaie d'un pouce de long. Le malade fut
porté à l'hôpital, cinq jours après l'accident; alors l'engorgement —
qui étoit considérable et la suppuration qui étoit de six à huit, —
nous empêchèrent de mettre des os ancrés, nous prâmes la plaie
avec la charpie sèche, la position de cette portion d'os se fit;
et le malade fut guéri au bout de deux mois et demi.

III observat.

Le Suisse d'un président de cette ville, fut renversé par un
carrosse, la roue lui passa sur la partie inférieure de la jambe
et lui fractura. La fracture étoit compliquée de deux plaies,
contuses, l'une sur la partie antérieure de la jambe, et l'autre
sur la partie postérieure; les parties molles furent meurtries & écorchées.
Le malade ne fut porté à l'hôpital que deux jours après
l'accident, la fracture avoit été réduite en ville; le gonflement

Et l'engorgement étoit considérable; il y avoit même des fluttes sur le pied et la jambe. Je fis saigner plusieurs fois le malade; on le pansa avec une fomentation émoulliente et résolutive.

La suppuration s'établit le huitième jour, elle fut affreuse tout le tissu cellulaire qui matelass la partie postérieure de la jambe, tomba en fonte; le tendon d'achille, le jambier postérieur, les flexisseurs communs des orteils, le flexisseur propre du ponce, furent détruits par la suppuration. Les pansements furent les plus simples, on l'avoit lullé avec une décoction d'émulsi; et on le pansoit avec la charpie sèche: ces moyens ont conduit le malade, avec parfaite guérison; il en a été quitte pour une anquilose du pied avec la jambe.

J'aurois plusieurs observations de même genre à citer, si cette matière n'étoit déjà connue; et si les dilatations que des auteurs recommandent ~~font~~ dans les fractures compliquées, de même que les grandes incisions qu'on fait pour ouvrir les abcès, n'étoient reconnues nuisibles. Elles mettent à découvert une quantité de parties nerveuses, et les exposent chaque pansement au contact immédiat de l'air; qui sert de cause irritante: de là la douleur, l'inflammation, les suppurations longues et putrides, (surtout dans les hôpitaux au moins dans celui de Bordeaux) et souvent la perte du malade; nous avons vu nombre de fois cette pratique suivie des accidents les plus funestes. Je suis persuadé que l'académie à vu souvent l'observation beaucoup plus concluante; que celles que le docteur Bouchard présente.



Observation an'atomique sur l'oblitération complète
du canal cistique. —

Un homme âgé de quarante cinq ans, fut porté à l'hôpital —
pour y être traité d'une pleurésie à la tête; qui le fit mourir le —
vingt-troisième jour de l'accident. aussitôt après la mort le cadavre proutens
l'examine des visceres du Bas-ventre, et je fus fort surpris en —
parcourant le foy; de ne pas trouver la vésicule du fiel: à sa
place je trouvais une portion de membrane froncée et décolorée.
et décolorée. pour l'examiner plus attentivement j'aporté le
foy, l'estomach, et l'intestin duodenum, après avoir disséqué
expartir avec la plus grande attention; je cherchi le canal colédoque que
je trouvais extrêmement gros: son diamètre l'égalloit celui —
d'un tubeau de ^{plume de} ~~plume de~~ l'inde. arrivé au rendez-vous du canal
hépatique avec le cistique, je voulus les examiner chacun
en particulier; je trouvais le canal cistique cartilagineux et entièrement
oblitéré, depuis ce qu'on appelle la tête d'oiseau ou le col de la
vésicule; jusqu'à deux lignes avant son insertion dans le
canal colédoque. Les tuniques de la vésicule du fiel, étoit collées
au foy; ^{la vésicule} et ne contenoit absolument aucun fluide: ni bile, ni
humour lymphatique d'aucune espèce, le canal hépatique étoit —
beaucoup plus gros qu'il ne doit être naturellement, sa grosseur
correspondoit à celle du canal colédoque; le foy étoit dans son
état naturel, ni plus gros ni d'une couleur différente de celle qu'il
doit avoir. La bile couloit dans l'intestin duodenum amène
que le foy la filtrait, sans être déposée dans un réservoir

particulier. L'estomac et L'intestin, étoient beaucoup plus
distendus qu'ils ne doivent être ordinairement; Les autres viscéres du
Bas-ventre étoient dans leur état naturel, et paraissent n'avoir
rien souffert de cette disposition particulière: qui semble
être la suite de quelque maladie inflammatoire de cette partie.
Si j'avois eu trouvé cette disposition j'aurois pu le malade, avant
de mourir; de me dire les circonstances qui avoit accompagné son



[illegible]